

VACCINAZIONE ANTI-COVID19 MODULO DI CONSENSO

PROG	RESSIV	0

COGNOME:	NOME:
NATO A:	
RESIDENTE A:	TELEFONO:
CAT. DI RISCHIO:	
CODICE FISCALE	TESSERA SANITARIA:
Allegato 1, di cui ricevo copia. Ho compilato in Sanitario la Scheda Anamnestica in Allegato 2.	ra ed ho del tutto compreso la Nota Informativa in in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
	a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della peutiche, nonché le conseguenze di un eventuale vaccinazione con la seconda dose.
informare immediatamente il mio Medico cura	qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità ante e seguirne le indicazioni. Accetto di rimanere comministrazione del vaccino per assicurarsi che non
Acconsente ed autorizza la somministrazione de	I vaccino Pfizer-BioNTech Covid19 ?
SI NO	
	Firma della Persona che riceve o rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale
Luogo e data:	



VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 NOTA INFORMATIVA

- 1. Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" è usato al fine di prevenire la malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
- Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di prevenire quindi l'insorgere della malattia.
- 3. Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" può essere somministrato a partire dai 16 anni d'età.
- 4. Il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento.
- 5. Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio.
 - Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.

È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.

Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che le ha somministrato la prima dose.

- Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19.
 - Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari.
 - Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
- 7. Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 contiene un RNA messaggero che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con produzione di anticorpi neutralizzanti.

RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 e ALC0159 per facilitare l'ingresso nelle cellule.

Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:

- 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
- colesterolo
- sodio fosfato bibasico diidrato
- · fosfato monobasico di potassio
- cloruro di potassio
- cloruro di sodio
- saccarosio
- acqua per preparazioni iniettabili

8. Il vaccino può causare reazioni avverse.

Tali reazioni possono essere:

Molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10):

- · dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
- stanchezza
- mal di testa
- dolori muscolari
- brividi
- dolori articolari
- febbre

Non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 100):

ingrossamento dei linfonodi

Rare

Sono state segnalate alcune rare gravi **reazioni allergiche** in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici.

I sintomi di una reazione allergica includono:

- orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto pruriginose);
- gonfiore del viso, della lingua o della gola;
- · respirazione difficoltosa.

In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso.

Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione.

L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi immediatamente il proprio Medico curante.

- 9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione del vaccino perché l'RNAm inoculato non può indurre la replicazione del virus.
- 10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

Luogo:			
Data:			
Ora:			

PROSSIMO APPUNTAMENTO PER IL RICHIAMO VACCINALE



ALLEGATO 2 AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID19 SCHEDA ANAMNESTICA

PRC	GRES	SSIV	0	

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.

COGNOME:	NOME:			
NATO A: IL:				
RESIDENTE A:	TELEFONO:			
CODICE FISCALE	TESSERA SANITARIA:			
2000 K				NON
ANAMNESI		SI	NO	so
Attualmente è malato?	es de deservos curastas pero especial es as	ery L		
Ha febbre?				
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farma	aci o ai componenti del vaccino?		June Ale	Light
Se sì, specificare:	<u> </u>	11/648	L-17-1	HAIP!
	Volkeg to a conflict	4.nger		L REE
	Together 1	Blaters	Bradday :	na sa
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricev	uto un vaccino?		Secretary in the	
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, n	nalattie renali, diabete, anemia o altre		17.	
malattie del sangue?	i desmi diretto lleg similare metti.	- (D-(V)		
Si trova in una condizione di compromissione del	sistema immunitario? (Esempio: cancro.			
leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?				
New Property of the comments for many in the inches	aliana a il aista ma immunitavia (acampia)		O A HOME	
Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indebo cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci ai	September 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F) 88-7		
radiazioni?	intermoran, oppore na subito trattamenti con			
	-nyler is objets may have that encours a significant	usie tro		La card
Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusio sono stati somministrati immunoglobuline (gamm			٤	
sono stati somministrati immunogiobuline (gamir	a) O lamaci antiviran:			
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche proble	ma al cervello o al sistema nervoso?			
Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane	? Se sì, quale/i?			
Per le donne: è incinta o sta pensando di rimaner	re incinta nel mese successivo alla prima o alla			
seconda somministrazione?	and version and all traditions consistent consistences (\$450000) and \$10000000 (\$2,00000).			
Sta allattando?				

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli integratori natur minerali o eventuali medicinali alternativi che sta assumendo:	ali, le vi	itamine,	i
ANAMNESI COVID-CORRELATA	SI	NO	NON SO
Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?			
Manifesta uno dei seguenti sintomi:			
- Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali?			
- Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?			
- Dolore addominale/diarrea?			
- Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?			
Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?			
Test COVID-19:			
Nessun test COVID-19 recente	<i></i>)	
Test COVID-19 positivo (Data:/)	/	/	_)
Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute:		4	
		-	